

आवरण तस्वीर: Plague soldier beetle, Cantharidae



परागसेची कीटहरूको पहिचान बारे सामान्य जानकारी



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

हाईमेनोप्टेरा: मौरीहरू



Blue-banded bee
Apidae -Amegilla sp.



Chequered cuckoo bee
Apidae



Common spring bee
Colletidae



European honey bee
Apidae



Golden-browed resin bee
Megachilidae



Halictid bee
(*Lipotriches sp.*)
Halictidae



Halictid bee
Halictidae



Hylaeus bee
Colletidae



Hylaeus bee (bubbling)
Colletidae



Large *Lasioglossum sp.*
Halictidae



Leafcutter bee
Megachilidae



Red bee
Halictidae

हाईमेनोप्टेरा: मौरीहरू

- ◆ अधिकतर यिनीहरू घाम लाग्ने, खुला जंगल, बगैचा तथा मैदान जहाँ धेरै नै फूलहरू हुन्छन् यस्ता स्थानहरूमा पाइने गर्दछन् ।
- ◆ यिनीहरू न्यानो, सफा र शान्त समय भएको वा अलिअलि सिर सिर हावा चलेका बेलामा सकृय हुने गर्दछन् ।
- ◆ यिनीहरू खुला बलौटे माटो, वा मृत काठहरूका प्वाल वा काप्चाहरू वा ढुंगाले बनेका पर्खालहरूमा आफ्नो गुँड (बास-स्थान) बनाउने गर्दछन् ।
- ◆ यिनीहरूको कद-आकार: ५ मि.मि. देखि २ से.मी.को हुन्छ, यिनीहरू कालो, सुनौलो, रातो, पहलो वा हरियो रंगका हुन्छन् भने, पेटमा प्रायः धर्काहरू भएका हुन्छन् ।

हाहाईरुमेनोप्टेरा: अरिङ्गालहरु, कमिलाहरु तथा करौंती भिङ्गाहरु



Ant
Formicidae



**Cream-spotted
ichneumon wasp**
Ichneumonidae



Cuckoo wasp
Chrysididae



European wasp
Vespidae



**Flower wasp
(female, wingless)**
Tiphiidae



Flower wasp (male)
Tiphiidae




Gasteruptiid wasp
Gasteruptiidae



Hairy ower wasp
Scoliidae



Orange ichneumon wasp
Ichneumonidae



Paper wasp
Vespidae



Paper wasp
Vespidae



Sawy adult
Tenthredinidae

हाईमेनोप्टेरा: अरिङ्गालहरु, कमिलाहरु तथा करौंती भिङ्गाहरु (स-प्लाईज)

- ◆ यिनीहरु सबै बास स्थानहरुमा पाइन्छन् । अरिङ्गालहरुले पातपतिङ्गरहरुका कुना काप्चा खाली माटो, अन्य कीराहरुको भित्र फुल पार्ने गर्दछन् । कमिलाहरुले जमिन मुनी वा रुख भित्र फुल पार्नेगर्दछन् भने, करौंती भिङ्गाहरु (सप्लाईज) ले पातमुनी फुल पार्दछन् ।
- ◆ यिनीहरुको कदमाप दायरा: ०.१ मि.मि. देखि १० से.मी. भन्दा माथिका साइजका हुन्छन् रंग: कालो, रातो, सुन्तलारंग, र खैरा सुनौला रंगका हुन्छन् ।
- ◆ अरिङ्गालहरु परभक्षी, तथा अन्य कीराहरुका परजीवी पनि हुन्छन् । करौंती भिङ्गाहरु (स-प्लाईज) लाभार्थी (केही स्पेसीस जातहरुलाई स्पिट फायर (Spit fires) पनि भन्दछन्) तिनीहरु धेरै बृहत संख्यामा भएमा यूकालिप्टस्को शत्रु कीरा पनि हुन सक्दछन्, कमिलाहरु अरु कीराहरुका परभक्षी हुन्छन् र केही स्पेसीसले माटोको स्वास्थ्यमा योगदान दिने गर्दछन् ।

डिप्टेरा: किंजाहरु




Bee fly (hairy)
Bombyliidae



Bee fly (large)
Bombyliidae



Blow fly
Calliphoridae



Blow fly
Calliphoridae



Drone fly
Syrphidae



Flesh fly
Sarcophagidae



Hover fly (*Ischiodon* sp.)
Syrphidae



Hover fly (*Melangyna* sp.)
Syrphidae



Lauxaniid fly
Lauxaniidae



March fly
Tabanidae



Rhiniidae fly
Rhiniidae



Soldier fly
Stratiomyidae

डिप्टेरा: किंजाहरु

- ◆ यिनीहरु सबै किसिमका बासस्थानहरुमा पाइन्छन्, यिनीहरुले पातपतिङ्गरका फोहरहरु, सानासाना ठाउँहरु कुना काप्चाहरुमा, खाली माटो (जमिन) मा अन्य कीराहरु वा कुहिएका प्रांगारिक पदार्थहरुमा फुल पार्ने गर्दछन् ।
- ◆ यिनीहरु शरद ऋतु र रैथाने मौरीको तुलनामा अलि अलि चिसो तापक्रममा सक्रिय हुन्छन् ।
- ◆ यिनीहरुको कदको आकार दायरा: १ मि. मि. देखि ३ सेमीसम्म । यिनीहरु कालो, पहेलो, सुन्तला, हरियो, खरानी, खैरो रंगका हुन्छन् ।
- ◆ धेरैजसो स्पेसिसहरु (जातहरु) अन्य कीराहरुका परभक्षी तथा परजीवी हुन्छन् ।


लेपिडोप्टेरा: दिनचर तथा रात्रीचर पुतलीहरु




Australian painted lady
Nymphalidae



Bogong moth
Noctuidae



Burnet
Zygaenidae



Cabbage white
Pieridae



Common grass blue
Lycaenidae



Common grass blue
Lycaenidae



Double-spotted line blue
Lycaenidae



Hawk moth
Sphingidae




Heliotrope moth
Arctiidae



Red-spotted Jezebel
Pieridae



Skipper
Hesperiidae



Swallowtail
Papilionidae

लेपिडोप्टेरा: दिनचर तथा रात्रीचर पुतलीहरु

- ◆ यिनीहरु सबै खालका बासस्थलहरुमा पाइने गर्दछन् । यिनीहरु पातपतिङ्गर तथा विरुवाहरुमा फुल पार्ने गर्दछन् ।
- ◆ यिनीहरुको प्यूपा (क्रीसलिस) रुखका काण्डमा भुण्डेका वा हाँगाहरु वा पातहरुको वरिपरि टाँसिएर कोया (cocoon) बुनेर रहेका हुन्छन् ।
- ◆ दिनचर पुतलीहरु दिउँसो र रात्रीचर मथहरु प्रायः राती सकृय हुन्छन् तर दिउँसो उडान गर्ने रात्रीचर मथहरु पनि पाइने गर्दछन् ।
- ◆ धेरैजसो लाभहरु विरुवा खाने गर्दछन् (पात वा हाँगाहरु) र केहीले अरु कीराहरुलाई खाने गर्दछन्, धेरै संख्यामा भएमा हानिकारक शत्रुहरु पनि हुन सक्दछन् ।
- ◆ कदको हदको दायरा: ३ मि.मि. देखि २० से.मी. भन्दा बढी

कोलियोप्टेरा: खपटेहरु



Golden stag beetle
Lucanidae



Jewel beetle
Buprestidae



Ladybird
Coccinellidae



Longicorn beetle
Cerambycidae



Pintail
Mordellidae



Plague soldier beetle
Cantharidae

कोलियोप्टेरा: खपटेहरु

- ♦ यिनीहरु सबै किसिमका बासस्थानहरुमा पाइन्छन्, स्थलीय तथा ताजा पानी, विविध जीवन इतिहासहरु ३ मुख्य समूहमा: वनस्पति भक्षी, परभक्षी शिकारी र शवभक्षी ।
- ♦ सबै जातहरु (स्पेसिस्) परागसेची हुँदैनन्, यहाँसम्म कि सबै फूलमा आगमन गर्ने अगन्तुकहरु पनि परागसेची हुँदैनन् । खपटे कीराहरु धेरै टाढा उडेर जान सक्दैनन् । त्यसकारण धेरैजसो सशक्त सम्भाव्य परागसेची खपटेहरु फूलहरुमा पाइने गर्दछन् ।
- ♦ कद आकारको दायरा: ०.४-८० मिलीमिटर, अगाडिका पखेटाहरु कडा (ईलाइट्रा) भएका विशेष लक्षण भएका हुन्छन् ।

Pollinators परागसेची जीवहरू

परागसेची जीवहरू किन महत्व राख्दछन् ?

- ◆ कैयन् फूल फूले विरुवाहरू (खाद्यान्न बालीहरू वा रैथाने विरुवाहरू) फल लाग्न कीट परागसेचीहरूमा भर पर्दछन् ।
- ◆ स्थानिक विरुवा-परागसेचीका विशेष सम्बन्धहरू धेरै हुन्छन् । यसकारण परागसेची संरक्षण भनेको साधारणतम् (सबै भन्दा बढी साधारण) स्पेसिस् (जातहरूमा) केन्द्रकृत गर्नु मात्र होइन ।
- ◆ मौरीहरू सबैभन्दा चिनिएका परिचित परागसेची हुनुका साथै तिनीहरू बढी प्रभावकारी तथा व्यवस्थापनीय (व्यवस्थापन गर्न सकिने) पनि हुन्छन् । तथापि हजारौं अन्य परागसेचीहरू पनि हुन्छन् ।
- ◆ यी कीटहरू मध्ये कैयन् कीटहरूले परागसेचन बाहेक पर्यावरणमा अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाहरू पनि खेल्दछन् जस्तै जैविक नियन्त्रण वा साधारणतया फोहर कुहाउने कार्य पनि गर्दछन् तथा जैविक विविधतामा महत्वपूर्ण योगदान प्रदायक हुन्छन् ।



कैयौं विरुवाहरू र परागसेची जीवहरू संगसंगै उत्पत्ति भएका छन् ।

परागसेची जीवहरूको संरक्षणको लागि सहयोग पुऱ्याउने उपायहरू

- ◆ फूल फूले विरुवाहरूको विविधताहरूको तथा वर्षभरि नै फूले विरुवाहरू उपलब्ध हुने निश्चित गर्नु पर्दछ ।
- ◆ परागसेची जीवहरूलाई गैर-फूल सम्बन्धी संसाधनको पनि आवश्यकता हुने गर्दछ जस्तै रुखको चोप, गुंड बनाउन आवश्यक स्थलहरू, पानी आदि ।
- ◆ परागसेचीको लागि गुंड बनाउन स्थलहरू, मौरी होटलहरू, मृत तथा/वा विरुवाको काण्डहरू, बलौटे खाली जमिन तथा पातका थुप्राहरू पनि प्रदान गर्नु पर्दछ ।
- ◆ रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग एकदमै कम गर्ने, धेरै कीटनाशक विषाधिहरूले हानिकारक कीटहरूका साथ साथै परागसेची जीवहरूलाई पनि मार्ने गर्दछन् । भारनाशक विषाधिहरूको अति प्रयोगले धेरै प्रकारका फूल फूले विरुवाहरूलाई सखाप बनाउने गर्दछ जसमाथि कैयन् परागसेची जीवहरू वर्षभरि भर पर्न सक्ने थिए ।
- ◆ आफुले अवलोकन गरेका तथा अनुभव गरेका अरुहरूसंग पनि ज्ञान बढाउन बाँड्नु पर्दछ ।

नोट: साधारणतया, फूलहरूमा देखिने अधिकतम कीटहरू सम्भाव्य परागसेची जीवहरू हुन सक्ने मान्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ स्रोत:

<https://cdn.buglife.org.uk/2019/07/Pollinator-identification-chart.pdf>

https://gacoast.uga.edu/wp-content/uploads/2020/08/2006-Pollinator-ID-Quick-Guide_PR.pdf

https://wildpollinatorcount.files.wordpress.com/2021/04/pollinators-nsw-ne-vic-2020_online.pdf

<https://www.floridamuseum.ufl.edu/wp-content/uploads/sites/37/2017/05/Native-Pollinators-SE.pdf>

Pollinator Insects

परागसेची कीटहरू



Orange ichneumon wasp *Ichneumonidae*

Retrieved and adapted from online pollinator information resources

Pollinator Insects (परागसेची कीटहरू)

Hymenopterans	Megachilids
<i>Apis laboriosa, dorsata and florea</i>	Anthophorids
Stingless bees	Syrphids
Bumble bees	Dipterans like <i>Musca</i> , Midges, Calliphorids
Alkali bees, Scoliids, Andrenids,	Lepidopterans
Xylocopids, Halictids	Coleopterans



थप जानकारीका लागि
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र
हरिहरभवन, श्रीमहल, ललितपुर, नेपाल
फोन नं.: ०१-५५२९१५१, ५५५०२२६
इमेल: cdabc2018@gmail.com



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations